

# Medicatieoverdracht Sint Maartenskliniek

19-03-2011





# Gespecialiseerd ziekenhuis

.....In houding en beweging

- Orthopedie.
- Reumatologie.
- Revalidatie.



# Doel:

- Inzicht in opname/ontslagprocedure SMK.
- Het belang van het op tijd kunnen beschikken over een **actueel** medicatieoverzicht.



# Waar gaan we het over hebben?

- Medicatieoverdracht bij opname/ontslag.
- Wat houdt screenings gesprek in?
- Wat houdt ontslaggesprek in?
- Waar is de patiënt bij gebaat?



# Medicatieoverdrachten

Opname → gepland

-via screening.

-via bureau patiëntenplanning

→ ongepland -spoedopname.

Ontslag →

- gesprek met iedere patiënt.



# In cijfers

(kwartaalcijfers 2010)

## Opname

- Revalidatie 94%
- Reuma 87%
- Orthopedie 95%

## Ontslag

- Revalidatie 90%
- Reuma 90%
- Orthopedie 80%



# Opname via screening → gepland

- patiënt vult thuis medicatieoverzicht in.
- Op dag preoperatieve screening bezoekt patiënt:  
anesthesist – opname arts - consulente-  
apothekersassistente (AA).
- AA controleert en vult zonodig gegevens aan.

**Medicijnenlijst ten behoeve van een opname in de Sint Maartenskliniek**  
 Vermeldt op deze lijst de medicijnen die u op dit moment gebruikt, uw gewicht en de gegevens van de apotheek die u meestal bezoekt. Heeft u moeite met het invullen van uw medicatiegebruik vraag dan uw apotheek om u te helpen. Als er onduidelijkheden zijn in uw medicatiegebruik nemen we contact op met de apotheek. Als u hier bezwaar tegen heeft, laat het ons dan weten.



**Sint Maartenskliniek**  
 NIJMEGEN

MAARTENSAPOTHEEK Hengstdal 3, 6522 JV Nijmegen, Tel. 024-3659677  
 H Beeraad, B vd Bemt, mw M.J.C. Deurvorst-Schwieler, apothekers Fax 024-3659827

~~RAAI LINDEN 6573 BK BEEK-UBBERGEN~~

patientensticker

**Gegevens van uw openbare apotheek:**  
 Naam apotheek: *de dukkel*  
 Plaats: *mellingen*  
 Telefoon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Datum POO: \_\_\_\_\_ Datum opname: \_\_\_\_\_  
 Afdeling: \_\_\_\_\_ (wordt ingevuld door apotheek)

naam geneesmiddel + vorm b.v. tablet, zetpil, aerosol, etc	sterkte:	gebruik:	innametijd	Uw gewicht = <i>61</i> kg
Voorbeelden:				
1. Paracetamol tablet	500 mg	3 x daags 2	8-12-17	↓ arts SMK invullen! Elke wijzigingen in medicatie noteren en de betreffende regel paraferen
2. Metoprolol retard tablet	100 mg	1 x daags 1	8	
<b>Schrijf ook de geneesmiddelen op die u zelf koopt bij apotheek of drogist</b>				
				Soort wijziging: per:.....
				Paraaf
1. <i>Zopiclon</i>	<i>1</i>	<i>xonodig 1x daags</i>		
2. <i>Paracetamol</i>	<i>500mg</i>	<i>xonodig max 3x daags 2</i>		
3. <i>Furosemide 40 mg</i>	<i>1</i>			
4. <i>metformine 500</i>	<i>2x1</i>		<i>7-17</i>	
5.				
6. <i>aleve</i>	<i>500mg</i>	<i>2dd</i>		
7. <i>cetirizine</i>	<i>10mg</i>	<i>xonodig 1dd</i>		
8.		<i>bij hoofkoud</i>		
9.				
10.				
11.				
Bijzonderheden (bijv. allergie of aandoeningen): <i>/</i>				Ruimte voor KNUK-stempel

Handtekening patiënt:

Paraaf screeningsarts:

Dit geneesmiddelenoverzicht is een gezamenlijk initiatief van de openbare apotheken en de ziekenhuizen in het Rijk van Nijmegen.

Paraaf apothekersassistent:



15-03-11 OM ASSORT UNIVE9665 KK 6752874-1  
Hevit EPH Hoober 17-08-1958  
Raailand 24 456725502  
SCANARCHIVEREN 1 ST 0,0070,00

**MEDICATIEAFSPRAKEN**  
(in te vullen door arts)



**Sint Maartenskliniek**  
NIJMEGEN

<b>ANESTHESIE / DAF/ EPO</b>	
<input type="checkbox"/> Pijntray obv gewicht volgens protocol	
<input checked="" type="checkbox"/> Paracetamol oraal/rectaal v.p. > 60 kg / ≤ 60 kg	
<input type="checkbox"/> Meloxicam oraal / rectaal v.p. (7,5 mg bij gewicht ≤ 50 kg, 15 mg bij gewicht > 50 kg)	
<input checked="" type="checkbox"/> Meloxicam oraal / rectaal TKP v.p.: gedurende 7 dagen 1d1t daarna zn.	
<input type="checkbox"/> Omeprazol 1 x daags 20 mg peri-operatief (5 dagen) <input type="checkbox"/> tijdens meloxicam-gebruik	
<input checked="" type="checkbox"/> Morfine 10 mg s.c. op geleide pijn + sedatie <input type="checkbox"/> PCA-pomp v.p.	
<input type="checkbox"/> Piritramide ..... mg s.c. op geleide pijn + sedatie <input type="checkbox"/> PCA-pomp v.p.	
<input type="checkbox"/> Ropivacaine 0,2% pomp v.p. <input type="checkbox"/> continu <input type="checkbox"/> bolussen	
<input checked="" type="checkbox"/> Ropivacaine 0,2% pomp v.p. epiduraal <input type="checkbox"/> met sufentanil 1 microgram/ml v.p.	
<input checked="" type="checkbox"/> Protocol PONV met <input checked="" type="checkbox"/> profylaxe dexamethason, droperidol, ondansetron <input type="checkbox"/> profylaxe dexamethason, droperidol <input type="checkbox"/> profylaxe dexamethason, ondansetron <input type="checkbox"/> zonder droperidol post OK	
<input type="checkbox"/> DAF-schema klein / groot	
<input type="checkbox"/> Erythropoëetine v.p.	Par.
<b>PREMEDICATIE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> paracetamol 1000 mg <input checked="" type="checkbox"/> meloxicam 15 mg	
<input checked="" type="checkbox"/> midazolam ..... mg <input type="checkbox"/> zn <input type="checkbox"/> oxazepam ..... mg <input type="checkbox"/> zn	Par.
<b>ANTIBIOTICA PROFYLAXE</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Cefazoline <u>preoperatief</u> éénmalig 20-30 min vóór de operatie	
<input type="checkbox"/> Cefazoline 3 dd gedurende 24 uur / 72 uur / TNO (1 <sup>e</sup> gift preoperatief)	
<input type="checkbox"/> Na afname kweken	
<input type="checkbox"/> Anders:	Par.
<b>TROMBOSEPROFYLAXE</b>	
<input type="checkbox"/> Clexane <u>preoperatief</u> ... dd 60mg / 80mg / 100mg / 120mg overbruggingstherapie, v.p.	
<input checked="" type="checkbox"/> Clexane <u>postoperatief</u> 1 dd 40 mg gedurende 6 weken / opname / tot INR 2 x>streefw.	
<input type="checkbox"/> Clexane <u>postoperatief</u> 2 dd 60 mg / 80 mg / 100 mg / 120 mg tot INR 2 x>streefwaarde	
<input type="checkbox"/> Clexane <u>postoperatief</u> OKdag t/m POD2: 1dd 40 mg, daarna 2 dd 60mg / 80mg / 100mg / 120 mg tot INR 2x>streefwrde	Par.
<b>OVERIG</b>	
<input type="checkbox"/> Ipramol 4 maal daags vernevelen start <input type="checkbox"/> pre- <input type="checkbox"/> post- operatief gedurende ... dagen / TNO	
<input type="checkbox"/> Haloperidol ... dd ... mg start <input type="checkbox"/> pre- <input type="checkbox"/> post- operatief gedurende ... dagen / TNO	
<input checked="" type="checkbox"/> Microlax klysma v.p. <i>disp.</i>	



# Waar controleren we op?

- Actuele medicatie.
- Zelfzorgmedicatie.
- Allergieën medicatie (wat zijn de klachten).
- Contra-indicaties.
- Interacties.
- Lichaamsgewicht.
- Evt. stoppen thuismedicatie ivm. OK.



# Daarnaast.....

- Verstrekken informatie omtrent peri-operatieve medicatie.
- Foldermateriaal.
- Beantwoorden vragen patiënt.



# Opnames → ongepland

- Zo snel mogelijk, maar zeker binnen 24 uur beschikken over actueel medicatieoverzicht.
- A.d.h. hiervan wordt concept deellijst gemaakt.
- medicatie patiënt wordt a.d.h. van deze lijst besproken tijdens opnamegesprek!!!!



# Ontslagprocedure

- Iedere patiënt wordt ontslaggesprek aangeboden.
- Krijgt ontslagrecept met hierop evt. pijnmedicatie en ontstolling.
- Mogelijkheid levering via politheek.



# Ontslaggesprek

## Adhv checklist:

- Aandacht voor wijzigingen thuismedicatie.
- Interactie: bv- NSAID ↔ bloeddrukverlagende middelen.
  - Tramadol ↔ SSRI's.
- Uitleg over pijnmedicatie.



# Ontslaggesprek met patiënt









# Overdracht naar eerste lijn

- Bij ontslag  
medicatiegegevens + aflevergegevens  
→ thuisapotheek/huisarts/instelling.

# Model SMK



apotheken

apotheken

Opname patiënt → Wijziging in farmacotherapie → Ontslag patiënt



# Waar is de patiënt mee gebaat?

.....Maatwerk.....

- Terug dringen aantal medicatiefouten.
- Vergroten patiëntveiligheid.



.....SAMENWERKEN.....



Sint Maartenskliniek  
NIJMEGEN

# Vragen?

